

R-miniCHOP (2day)

3週毎

| 薬品名 | 投与量 | 手技 | 点滴時間 |
|-----|-----|----|------|
|-----|-----|----|------|

<前投薬>リツキシマブ投与30分前に内服

Day 1

抗ヒスタミン薬、解熱鎮痛薬

Day 1

| | | | |
|---------------|-------|--------|-----|
| 生理食塩液 | 50 mL | | |
| クロルフェニラミン5 mg | 1A | d.i.v. | 15分 |
| メチルプレドニゾロン | 40 mg | | |

| | | | |
|--------|-----------------------|--------|--|
| 生理食塩液 | 500 mL | d.i.v. | 初回50→100→150→200 mg/h(30分毎) 二回目以降100→200→300→400 mg/h(30分毎) |
| リツキシマブ | 375 mg/m ² | | |

| | | | |
|-------|-------|--------|--------|
| 生理食塩液 | 50 mL | d.i.v. | フラッシュ用 |
|-------|-------|--------|--------|

Day 2

| | | | |
|------------|--------|--------|-----|
| グラニセトロンバッグ | 100 mL | d.i.v. | 30分 |
|------------|--------|--------|-----|

| | | | |
|----------|----------------------|--------|----|
| 生理食塩液 | 100 mL | d.i.v. | 全開 |
| ドキシソルビシン | 25 mg/m ² | | |

| | | | |
|---------|--------------------------------|--------|-------------|
| 生理食塩液 | 50 mL | d.i.v. | 全開 |
| ビンクリスチン | 0.7 mg/m ² (最大2 mg) | | 基本1 mg/body |

| | | | |
|-----------|-----------------------|--------|----------|
| 生理食塩液 | 500 mL | d.i.v. | 250 mL/h |
| シクロホスファミド | 400 mg/m ² | | |

| | | | |
|-------|-------|--------|--------|
| 生理食塩液 | 50 mL | d.i.v. | フラッシュ用 |
|-------|-------|--------|--------|

Day 2~6

| | | | |
|---------|------------|------|-----|
| プレドニゾロン | 60 mg/body | p.o. | 5日分 |
|---------|------------|------|-----|