

FOLFIRI/C-mab(初回)

2週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

Day 1

パロノセトロンバッグ デキサメタゾン クロルフェニラミン5 mg	50 mL 9.9 mg 1A	d.i.v.	15分
--	-----------------------	--------	-----

生理食塩液 セツキシマブ	500 mL 400 mg/m ²	d.i.v.	120分
-----------------	---------------------------------	--------	------

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

5%ブドウ糖液 レボホリナート	250 mL 200 mg/m ²	d.i.v.	125 mL/h イリノテカン と同時に
--------------------	---------------------------------	--------	----------------------------

5%ブドウ糖液 イリノテカン	250 mL 150 mg/m ²	d.i.v.	120分 レボホリナート と同時に
-------------------	---------------------------------	--------	-------------------------

生理食塩液 5-FU	50 mL 400 mg/m ²	d.i.v.	5分
---------------	--------------------------------	--------	----

生理食塩液 5-FU	全量100 mL 2400 mg/m ²	ポンプ	46時間 持続点滴
---------------	------------------------------------	-----	-----------

Day 8

生理食塩液 デキサメタゾン クロルフェニラミン5 mg	50 mL 3.3 mg 1A	d.i.v.	15分
-----------------------------------	-----------------------	--------	-----

生理食塩液 セツキシマブ	250 mL 250 mg/m ²	d.i.v.	60分
-----------------	---------------------------------	--------	-----

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

FOLFIRI/C-mab(2回目以降)2週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1			
パロノセトロンバッグ デキサメタゾン クロルフェニラミン5 mg	50 mL 9.9 mg 1A	d.i.v.	15分
生理食塩液 セツキシマブ	250 mL 250 mg/m ²	d.i.v.	60分
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
5%ブドウ糖液 レボホリナート	250 mL 200 mg/m ²	d.i.v.	125 mL/h イリノテカン と同時に
5%ブドウ糖液 イリノテカン	250 mL 150 mg/m ²	d.i.v.	120分 レボホリナート と同時に
生理食塩液 5-FU	50 mL 400 mg/m ²	d.i.v.	5分
生理食塩液 5-FU	全量100 mL 2400 mg/m ²	ポンプ	46時間 持続点滴
Day 8			
生理食塩液 デキサメタゾン クロルフェニラミン5 mg	50 mL 3.3 mg 1A	d.i.v.	15分
生理食塩液 セツキシマブ	250 mL 250 mg/m ²	d.i.v.	60分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分