

ゾルベツキシマブ/CAPOX(初回)3週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

Day 1~14

カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	p.o.	14日分
--------	-----------------------------	------	------

Day 1

生理食塩液	100 mL	側管	d.i.v.	悪心時ラインキープ用
-------	--------	----	--------	------------

Day 1

パロノセトンバッグ	50 mL			
デキサメタゾン	6.6 mg			
ファモチジン20 mg	1A	d.i.v.		30分
クロルフェニラミン5 mg	1A			
ホスネツピタント	1V			

生理食塩液	50 mL		d.i.v.	5分
-------	-------	--	--------	----

生理食塩液	*500 mL × 2本		d.i.v.	フィルター付きラインを使用のこと
ゾルベツキシマブ	800 mg/m <sup>2</sup>			
注射用水(100 mL)	1本			ゾルベツキシマブ調製用

<投与速度> 0~30分:75 mL/h, 30~60分:150 mL/h, 60分以降:300 mL/h

\* 希釈濃度が2mg/mLとなるように生食の量を調節

\* ゾルベツキシマブの投与量が1400mgを超える場合は1000mL × 1本に変更

生理食塩液	50 mL		d.i.v.	5分
-------	-------	--	--------	----

5%ブドウ糖液	500 mL			
オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.		120分
デキサメタゾン	3.3 mg			

生理食塩液	50 mL		d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--	--------	--------

ゾルベツキシマブ/CAPOX(2回目以降)3週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

## Day 1~14

カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	p.o.	14日分
--------	-----------------------------	------	------

## Day 1

生理食塩液	100 mL	側管	d.i.v.	悪心時ラインキープ用
-------	--------	----	--------	------------

## Day 1

パロノセトンバッグ	50 mL			
デキサメタゾン	6.6 mg			
ファモチジン20 mg	1A	d.i.v.		30分
クロルフェニラミン5 mg	1A			
ホスネツピタント	1V			

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

生理食塩液	*500 mL	d.i.v.	フィルター付きラインを使用のこと
ゾルベツキシマブ	600 mg/m <sup>2</sup>		
注射用水(100 mL)	1本		ゾルベツキシマブ調製用

<投与速度> 0~30分:55 mL/h, 30~60分:110 mL/h, 60分以降:220 mL/h

\* 希釈濃度が2mg/mLとなるように生食の量を調節

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
-------	-------	--------	----

5%ブドウ糖液	500 mL			
オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.		120分
デキサメタゾン	3.3 mg			

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

薬品名	投与量	手技	点滴時間
Day 1~14			
カペシタビン	2000 mg/m <sup>2</sup> /day	p.o.	14日分
Day 1			
生理食塩液	100 mL	側管	d.i.v. 悪心時ラインキープ用
Day 1			
パロノセトンバッグ	50 mL		
デキサメタゾン	6.6 mg		
ファモチジン20 mg	1A	d.i.v.	30分
クロルフェニラミン5 mg	1A		
ホスネツピタント	1V		
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
生理食塩液	*500 mL	d.i.v.	120分
ゾルベツキシマブ	600 mg/m <sup>2</sup>		フィルター付きラインを使用のこと
注射用水(100 mL)	1本		ゾルベツキシマブ調製用
* 希釈濃度が2mg/mLとなるように生食の量を調節			
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	5分
5%ブドウ糖液	500 mL		
オキサリプラチン	130 mg/m <sup>2</sup>	d.i.v.	120分
デキサメタゾン	3.3 mg		
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用