

DCd皮下注①(1サイクル目)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服
 Day 1, 2, 8, 15, 22
 アセトアミノフェン(500)2錠
 ジフェンヒドラミン(10)5錠
 モンテルカスト(10)1錠

Day 1

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	20 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	1本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与

Day 2

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	20 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	1本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

Day 3

プレドニゾン	15 mg	p.o.	
--------	-------	------	--

Day 8

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与

Day 9

生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	100 mL 56 mg/m ²	d.i.v.	30分
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

Day 15

生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	100 mL 56 mg/m ²	d.i.v.	30分
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
ダラキュー口®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与

Day 16

生理食塩液 デキサメタゾン	50 mL 19.8 mg	d.i.v.	15分
生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
5%ブドウ糖液 カルフィゾミブ	100 mL 56 mg/m ²	d.i.v.	30分
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用
生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用

Day 22

レナデックス®	40 mg/body	p.o.	前投薬として内服
ダラキュー口®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与

DCd皮下注②(2サイクル目)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服

Day 1, 8, 15, 22

アセトアミノフェン(500)2錠

ジフェンヒドラミン(10)5錠

モンテルカスト(10)1錠

Day 1, 8, 15

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	--------------	------	-----------

Day 2, 9, 16

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 22

レナデックス®	40 mg/body	p.o.	前投薬として内服
---------	------------	------	----------

ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	--------------	------	-----------

DCd皮下注③(3~6サイクル目)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服

Day 1, 15

アセトアミノフェン(500)2錠
ジフェンヒドラミン(10)5錠
モンテルカスト(10)1錠

Day 1, 15

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	--------------	------	-----------

Day 2, 8, 9, 16

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 22

レナデックス®	40 mg/body	p.o.	
---------	------------	------	--

DCd皮下注④(7サイクル目以降)

4週毎

薬品名	投与量	手技	点滴時間
-----	-----	----	------

<前投薬>ダラキューロ®投与1~3時間前に内服

Day 1

アセトアミノフェン(500)2錠

ジフェンヒドラミン(10)5錠

モンテルカスト(10)1錠

Day 1

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

ダラキューロ®	1800 mg/body	s.c.	3~5分かけて投与
---------	--------------	------	-----------

Day 2, 8, 9, 15, 16

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	15分
デキサメタゾン	19.8 mg		

生理食塩液	100 mL	d.i.v.	30分
-------	--------	--------	-----

5%ブドウ糖液	100 mL	d.i.v.	30分
カルフィゾミブ	56 mg/m ²		
注射用水(20 mL)	3本		カルフィゾミブ調製用

生理食塩液	50 mL	d.i.v.	フラッシュ用
-------	-------	--------	--------

Day 22

レナデックス®	40 mg/body	p.o.	
---------	------------	------	--